

Полезная информация

ВНИМАНИЕ! ОПАСНЫЕ СОСЕДЫ!

информация для родителей

57-26-26 – телефон доверия для тех, кто имеет проблемы с употреблением алкоголя, табака или наркотиков.

8 800 2000122, 64-63-07 –

детский телефон доверия для оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям.

77-28-99 – горячая линия телефона доверия ВИЧ-СПИД с 19:00 до 07:00

77-03-51 – по этому телефону можно анонимно сообщить о местах продажи наркотиков.

57-24-68 – амбулаторная детско-подростковая служба диспансера. Ул. Невельская 4-Г.

Клещевина

Все части растения клещевины и в особенности семена содержат белок рицин и алкалоид рицинин – они очень ядовиты для человека и животных.

Яд рицина для человека смертелен, первые симптомы наступают примерно через 15 часов – поднимается температура, наливаются кровью глаза, возникает тошнота, рвота, кровавый понос, сильная боль в животе, судороги, психиатическая заторможенность. Этим самым благополучия сменяются утяжелением состояния. Как правило, смерть от острого отравления наступает через 6–8 дней. Человеку достаточно 0,003 мг/кг перорально. Таким образом, если ребенок съел 1–3 семени клещевины отравление стопроцентно гарантировано, съел до шести семян – летальный исход.



Белена

Всем известно выражение «белены объелся». Отравление беленою возможно либо при употреблении молодых сладких ростков (апрель – май), либо при поедании семян, напоминающих маковые. Спустя несколько минут возникает спутанность сознания, сильное возбуждение, головокружение, зрительные галлюцинации, охриплость голоса, сухость во рту. Глаза начинают блестеть, зрачки расширяются. Пострадавшему чудятся кошмары, он в страхе мечется в поисках спасения. Затем наступает потеря сознания.



Мак

Употребление опиатов ведёт к риску заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами из-за использования общих шприцов; поражение печени; сильное снижение иммунитета и, как следствие, подверженность инфекционным заболеваниям; заболевания вен, разрушение зубов из-за нарушения кальциевого обмена; снижение уровня интеллекта. Очень велика опасность передозировок с тяжелыми последствиями, вплоть до смерти.

Буклет издан в рамках областной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Оренбургской области на 2013-2016 гг.»


Буклет разработан Детско-подростковой
наркологической службой ГБУЗ «ООКНД»

Цветок лотоса (индийский дурман)



Красота растения коварна, за ней прячется страшное свойство — ядовитость. «Бешеное зелье». Все части дурмана содержат опасный уровень ядов и могут быть фатальными для людей или животных при глотании. Симптомы отравления включают в себя учащение сердцебиения, сухость слизистых оболочек, сухой

Белладонна



Все части белладонны чрезвычайно токсичны; от десяти до двадцати ее черных блестящих ягод размером с небольшую вишню достаточно для того, чтобы привести к смертельному исходу.


Отравление протекает по типу острого психоза с галлюцинациями, характерны двигательное и речевое возбуждение, бред, судороги. Отмечается сухость во рту, сильная жажда, затруднение глотания и мочеиспускания, сердцебиение, тахикардия. В результате нарушения потоотделения резко поднимается температура. Наблюдается гиперемия кожи лица, расширение зрачков, светобоязнь. При тяжелых формах — нарушение дыхания, потеря сознания, возможен смертельный исход.



Конопля


При курении симптомы отравления возникают с первых минут, при введении внутрь — через 30-60 мин.

Развивается психическое и двигательное возбуждение, расширяются зрачки, появляются шум в ушах и яркие зрительные галлюцинации. Затем наступают слабость, вялость, глубокий сон. У некоторых людей при этом понижается температура тела, пульс замедляется, возможно падение АД.



У женщин курение марихуаны приводит к нарушению менструального цикла. Если этот наркотик принимается во время беременности, то вероятность заболевания будущего ребенка редкой формой лейкемии повышается в 10 раз по сравнению с нормой. А частота раковых заболеваний у детей, родители которых употребляли марихуану до зачатия, и тех, чьи матери курили её во время беременности, превышает средний уровень в 2-5 раз.

К тому же, их коэффициент интеллекта на 30-40 процентов ниже, чем у других детей. Употребление производных каннабиса увеличивает риск возникновения рака легких, ухудшает память, внимание и способность к обучению, ведет к снижению веса, а также к импотенции у мужчин.



кашель, возможны судороги. На начальной стадии воздействия наблюдаются возбуждение (иногда проявляющееся в виде беспринципного смеха), забывчивость, заторможенное состояние, переходящее в повторяющиеся периоды активности. Также появляются яркие галлюцинации и бред. Периоды возбуждения обычно сменяются долгим глубоким сном, сопровождающимся яркими сновидениями и галлюцинациями. После пробуждения появляется ощущение того, что всё происходило с другим человеком. Смерть наступает при явлениях паралича дыхательного центра и сосудистой недостаточности.